

English

Diarrhoea

About diarrhoea

Diarrhoea is passing looser or more frequent stools than is normal for you.

It affects most people from time to time and is usually nothing to worry about. However, it can be distressing and unpleasant until it passes, which normally takes a few days to a week.

What causes diarrhoea?

There are many different causes of diarrhoea, but a bowel infection ([gastroenteritis](#)) is a common cause in both adults and children.

Gastroenteritis can be caused by:

- a virus – such as [norovirus](#) or rotavirus
- bacteria – such as campylobacter and Escherichia coli (E. coli), which are often picked up from contaminated food
- a parasite – such as the parasite that causes giardiasis, which is spread in contaminated water

These infections can sometimes be caught during travel abroad, particularly to areas with poor standards of public hygiene. This is known as travellers' diarrhoea.

Diarrhoea can also be the result of anxiety, a [food allergy](#), medication, or a long-term condition, such as [irritable bowel syndrome \(IBS\)](#).

Urdu

اردو

دستوں کی بیماری

دستوں کے بارے میں

آپکو معمول سے بڑھ کر پتھر یا بار بار آئے والے پاخانے کو دست کہتے ہیں۔

"وقتاً فوچتاً" اس کا اثر زیادہ تر لوگوں پر ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ نامہ یہ عمل جب تک ختم نہ ہو جائے پریشان کن اور غیر خوشگوار ہوتا ہے اور عام طور پر اس پر چند دنوں سے لیکر ایک ہفتہ تک لگتا ہے۔

دستوں کی بیماری کا سبب کیا ہے؟

دستوں کی بیماری کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں لیکن پاخانے کا انفیکشن ([معدے اور انٹریوں کا ورم](#)) بچوں اور بڑی عمر کے افراد دونوں میں ایک مشترک وجہ ہے۔

معدے اور انٹریوں کا ورم حسب ذیل کے سبب ہو سکتا ہے:

- ایک وائرس - مثلاً [نورووائرس](#) یا روٹا وائرس [یعنی وہ وائرس جو چھوٹے بچوں میں معدے اور چھوٹی آنت کی میوکس جھلی کی سوزش پیدا کرتا ہے]
- بکٹریا - جیسا کہ گرام منفی جراثیم اور ایشیرکیا کولی (ای-کولی) جو کہ اکثر اوقات الودہ غذا سے آتے ہیں۔
- پیراسائیٹ [ٹفیلینٹ] - جیسا کہ وہ پیراسائیٹ جو جیارڈیاسیس کا سبب بنتے ہیں جو الودہ پانے سے پہلنا ہے۔

یہ انفیکشن بعض اوقات بیرون ملک سفر کے دوران خاص کران علاقوں میں ہو جاتا ہے جہاں عوامی صحت کے اصولوں کا معیار ناقص ہوتا ہے۔ اس کو سفری دستوں کی بیماری کہتے ہیں۔

دستوں کی بیماری فکرمندی [غذائی الرجی](#)، دوا، یا طویل مدت کی بیماری جیسا کہ [خراش اور معائی عالمیہ \(ائی بی ایس\)](#) کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔

What to do if you have diarrhoea

Most cases of diarrhoea clear up after a few days without treatment, and you may not need to see your GP.

However, diarrhoea can lead to dehydration, so you should drink plenty of fluids – small, frequent sips of water – until it passes. It's very important that babies and small children do not become dehydrated.

Your pharmacist may suggest you use an oral rehydration solution (ORS) if you or your child are particularly at risk of dehydration.

You should eat solid food as soon as you feel able to. If you're breastfeeding or bottle feeding your baby and they have diarrhoea, you should try to feed them as normal.

Stay at home until at least 48 hours after the last episode of diarrhoea to prevent spreading any infection to others.

Medications to reduce diarrhoea, such as loperamide, are available. However, these are not usually necessary, and most types should not be given to children.

Diarrhoea self-help guide

Complete this guide to assess your symptoms and find out if you should visit your GP, pharmacist or treat your condition at home.

اگر آپکو دستوں کی بیماری لگ جائے تو کیا کریں؟

دستوں کی بہت سی صورتیں چند ایک دنوں کے بعد بلا علاج ختم ہو جاتی ہیں اور آپکو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

تاہم دستوں کی بیماری پانی کے زیاب کا سبب بن سکتی ہے لہذا آپکو کافی مقدار میں سیال نوش کرنا چاہیے۔ جب تک یہ ختم نہ ہو جائیں پانی کی چھوٹی چھوٹی اور بار بار چسکیاں لینا۔ یہ بہت لازمی ہے کہ شیر خوار اور نو عمر بچوں میں پانی کی کمی نہ واقع ہونے دی جائے۔

اگر آپ اور آپ کا بچہ خاص طور پر جسم میں پانی کے زیاب کے خطرے سے دوچار ہیں تو آپ کا فارما سیسٹ آپ کو اور لری پائیئریشن سلوشن (او آر ایس) تجویز کر سکتا ہے۔

جونہی آپکو محسوس ہو کہ آپ اس قابل ہیں آپکو ٹھوس غذا کھانی چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سینے یا بوتل کے ساتھ دودھ پلا ربی ہیں اور ان کو دست لگ گئے ہیں تو آپ ان کو معمول کے مطابق غذا دینے کی کوشش کریں۔

دستوں کا آخری حملہ ہونے کے بعد کم از کم 48 گھنٹوں تک گھر پر ہی رہیں تاکہ دوسروں تک انفیکشن پھیلانے کو روکا جاسکے۔

دست کرنے کی ادویات جیسا کہ لوپرمیڈ ہے، دستیاب ہیں۔ تاہم، عام طور پر یہ ضروری نہیں ہوتیں لہذا ان میں سے زیادہ تر بچوں کو نہیں دی جانی چاہیں۔

دستوں کی بیماری اپنی - مدد آپ کا کتابچہ

اپنی علامات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آپ کو علاج کے لیے جی پی، فارما سیسٹ کے پاس جانا چاہیے یا گھر پر اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے اس گائیڈ کا مطالعہ کریں۔

When to see your GP

Contact your GP or call NHS 24's 111 service for advice if you're concerned about yourself or your child.

It's important to see your GP if the diarrhoea is particularly frequent or severe, or associated with other symptoms, such as:

- blood in your or your child's stool
- persistent vomiting
- a severe or continuous stomach ache
- weight loss
- signs of dehydration – including drowsiness, passing urine infrequently, and feeling lightheaded or dizzy
- your stool is dark or black – this may be a sign of bleeding inside your stomach

You should also contact your GP if your or your child's diarrhoea is particularly persistent, as this may be a sign of a more serious problem. In most cases, diarrhoea should pass within about a week.

Preventing diarrhoea

Diarrhoea is often caused by an infection. You can reduce your risk by making sure you maintain high standards of hygiene.

For example, you should:

- wash your hands thoroughly with soap and warm water

اپنے جی پی کے پاس کب جائیں

اگر آپکو اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں خدشہ لاحق ہے تو اپنے جی پی کے ساتھ رابطہ کریں یا این ایج ایس کی 24 گھنٹے سروس کو 111 پر مشورہ کے لیے فون کریں۔

خاص طور پر جب دست بہت زیادہ اور شدید ہوں یا حسب ذیل دیگر علامات بھی موجود ہوں تو اپنے جی پی کے پاس جانا اہم ہوتا ہے:

- آپ یا آپ کے بچے کے پاخانے میں خون؟
- متواتر الٹی؟
- معدے کے اندر شدید اور متواتر درد؟
- وزن کم ہونا؟
- بانی کے زیاد کی علامات – بشمول عنودگی، پیشاب کم آنا اور سرچکرانا یا سرگھومتا ہوا محسوس کرنا؟
- آپ کا پاخانہ سیاہی مائل یا سیاہ رنگ کا ہے۔ یہ آپکے معدے کے اندر خون رنسے کی علامت ہو سکتا ہے۔

اگر آپکے بچے یا آپکو مسلسل دست آرہے ہیں تو آپ کو اپنے جی پی سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی زیادہ تشویشناک مسئلے کی علامات ہو سکتا ہے۔ بہت سی صورتوں میں تقریباً "ایک بچے کے اندر اندر دست آئے ختم ہو جائے چاہیے"۔

دستوں کی بیماری کی روک تھام

دستوں کی بیماری زیادہ ترافیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ صحت و صفائی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا جائے خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔

مثال کے طور پر آپکو چاہیے کہ:

- ٹوائٹ جانے کے بعد، کہاں کہاں سے قبل یا کہاں کی تیاری کے وقت اپنے ہاتھوں

after going to the toilet and before eating or preparing food

- clean the toilet, including the handle and the seat, with disinfectant after each bout of diarrhoea
- avoid sharing towels, flannels, cutlery, or utensils with other household members

It's also important to practise good food and water hygiene while travelling abroad, such as avoiding potentially unsafe tap water and undercooked food.

Symptoms of diarrhoea

Diarrhoea is where you frequently pass watery or loose poo. Some people may also have other symptoms, depending on the cause.

Associated symptoms can include:

- stomach cramps
- nausea and vomiting
- headache
- loss of appetite

The excessive loss of water in your poo can also sometimes lead to dehydration, which can be serious if it's not recognised and treated quickly.

کو صابن اور گرم پانی کے ساتھ مکمل طور پر صاف کریں؛

- دست کے ہر چکر کے بعد ٹوائیٹ بشمول بینڈل اور سیٹ کو جراشیم کش دوا کے ساتھ صاف کریں؛
 - دیگر اپل خانہ کے ساتھ دوسروں کا تولیہ، فلاں، یا برتن شیئر کرنے سے اجتناب کریں۔
- بیرون ملک سفر کے دوران اچھی خوراک اور پانی کی صفائی کے اصول اپنانا، مثال کے طور پر غیر محفوظ نلکے کا پانی یا ان پکا کھانے سے اجتناب کرنا اہمیت کا حامل ہے۔

دستوں کی بیماری کی علامات

دستوں کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوبار بار پانی جیسا اور پتلا پاخانہ آتا ہو۔ مرض کے سبب کی بنیاد پر چند ایک لوگوں میں مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔

متعلقہ علامات میں حسب ذیل شامل ہو سکتی ہیں:

- معدے کے اندر مروڑ؛
- جی متلانا اور قرے آنا؛
- سردرد؛
- بھوک ختم ہو جانا۔

آپ کے پاخانے میں بہت زیادہ پانی کا اخراج بھی پانی کے زیاب کا سبب بن سکتا ہے جس کی نشاندہی کر کے اگر فوری طور پر علاج نہ کر دیا جائے تو یہ نشوشنگ ہو سکتا ہے۔

جسم میں پانی کے زیاد کی علامات

بچوں میں پانی کے زیاد کی حسب ذیل علامات شامل ہو سکتی ہیں:

- چڑھاپن یا عنودگی؛
- پیشاب کم آنا؛
- پیلی یا دھبے دار جلد؛
- ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈا ہونا؛
- وہ زیادہ بیمار محسوس کرتے ہیں یا نظر آتے ہیں۔

بڑوں میں پانی کے زیاد کی حسب ذیل علامات شامل ہو سکتی ہیں:

- تھکاوت اور توانائی کی کمی؛
- بھوک ختم ہو جانا؛
- جی متلانا؛
- سر چکرانے کا احساس؛
- سر چکرانا؛
- خشک زبان؛
- ڈوبی ہوئی آنکھیں؛
- پٹھوں میں موج آنا؛
- دل کی تیز دھڑکن۔

Signs of dehydration

Signs of dehydration in children can include:

- irritability or drowsiness
- passing urine infrequently
- pale or mottled skin
- cold hands and feet
- they look or feel increasingly unwell

Signs of dehydration in adults can include:

- tiredness and a lack of energy
- loss of appetite
- nausea
- feeling lightheaded
- dizziness
- dry tongue
- sunken eyes
- muscle cramps
- rapid heartbeat

When to seek medical advice

Contact your GP or call NHS 24's 111 service for advice if you are concerned about yourself or your child.

طبی مشورہ کب حاصل کریں

اگر آپکو اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں خدشہ لاحق ہو تو اپنے جی پی کے ساتھ رابطہ کریں یا این ایج ایس کی 24 گھنٹے سروس کو 111 پر مشورہ کے لیے فون کریں۔

You should also contact your GP in the situations outlined below, as they may mean that you or your child has, or is at risk of, a more serious problem.

Babies

You should contact your GP or health visitor urgently if your baby has had 6 or more episodes of diarrhoea in the past 24 hours, or if they have vomited 3 times or more in the past 24 hours.

You should also seek advice if your baby has any symptoms of dehydration.

Children

Contact your GP if your child has:

- had 6 or more episodes of diarrhoea in the past 24 hours
- diarrhoea and vomiting at the same time
- watery poo
- blood in their poo
- a severe or continuous stomach ache
- symptoms of dehydration

You should also contact your GP if your child has persistent diarrhoea. Most cases will pass in 5 to 7 days.

Adults

Contact your GP if you have diarrhoea and:

آپکو مندرجہ ذیل صورتوں میں بھی اپنے جی پی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یا آپکا بچہ تشویشناک مسئلہ سے دوچار رہا ہے یا اسوقت بھی ایسا ہی ہے۔

شیرخوار بچے

اگر گزشتہ 24 گھنٹوں میں آپکے بچے کو 6 یا اس سے زیادہ دست آچکے ہوں یا انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 سے زیادہ بار الٹی کی ہو تو فوری طور پر اپنے جی پی یا ہیلتمہ ویزٹر کے ساتھ رابطہ کریں۔

اگر آپکے بچے کے جسم میں پانی کے زیان کی علامات ہوں تو بھی آپ کو مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔

بچے

اگر آپکا بچہ حسب ذیل سے دوچار ہو تو جی پی سے رابطہ کریں:

- گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 یا زیادہ بار دست آچکے ہیں؛
- ایک ہی وقت میں الٹی اور دست لگے ہوئے ہیں؛
- پاخانے پانی کی طرح ہے؛
- ان کے پاخانے میں خون ہے؛
- معدے کے اندر شدید یا متواتر درد؛
- جسم کے اندر پانی کے زیان کی علامات۔

اگر آپکے بچے کو مسلسل دست لگے ہوئے ہوں تو بھی آپ اپنے جی پی سے رابطہ کریں۔ زیادہ تر حالات 5 تا 7 دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

بالغ افراد

اگر آپکو دستوں کی بیماری اور حسب ذیل علامات ہوں تو اپنے جی پی کے ساتھ رابطہ کریں:

- there is blood in your poo
- you are vomiting persistently
- you've lost a lot of weight
- you have passed a large amount of very watery diarrhoea
- it occurs at night and is disturbing your sleep
- you have recently taken antibiotics or been treated in hospital
- you have symptoms of dehydration
- your poo is dark or black – this may be a sign of bleeding inside your stomach

You should also contact your GP if you have persistent diarrhoea. Most cases in adults will pass in 2 to 4 days.

Causes of diarrhoea

Diarrhoea usually occurs when fluid cannot be absorbed from the contents of your bowel, or when extra fluid is secreted into your bowel, causing watery poo.

Short-term diarrhoea

Diarrhoea is usually a symptom of a bowel infection (gastroenteritis), which can be caused by:

- a virus – such as norovirus or rotavirus
- bacteria – such as campylobacter, Clostridium difficile (C. difficile), Escherichia coli (E. coli), salmonella or shigella; these can all cause food poisoning

- آپ کے پاخانے میں خون ہو؛
 - آپ مسلسل الثیان کر رہے ہوں؛
 - آپ کا بہت زیادہ وزن کم ہو گیا ہو؛
 - آپکو پانی جیسے دست کافی مقدار میں آچکے ہوں؛
 - یہ رات کے وقت ہوتے ہیں اور آپکی نیند میں خلل ڈالتے ہیں؛
 - آپ نے حال ہیں میں ایٹھی بائیوٹک استعمال کی ہے یا ہسپتال میں آپکا علاج ہوا ہے؛
 - آپ کے اندر پانی کے زیاد کی علامات ہیں؛
 - آپ کا پاخانہ سیاہی مائل یا سیاہ رنگ کا ہے - یہ آپکے معدے کے اندر خون رنسے کی علامت ہو سکتا ہے۔
- اگر آپ کو مسلسل دست لگے ہوئے ہوں تو بھی آپ اپنے جی پی سے رابطہ کریں۔ بالغ افراد کی صورت میں یہ حالت 2 تا 4 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔

دست آنے کی وجوہات

دستوں کی بیماری عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب آپکے پاخانے میں موجود سیال کو جذب نہیں کیا جا سکتا یا آپ کے پاخانے میں اضافی سیال خارج ہو جاتا ہے جو کہ پانی کی طرح پنے پاخانے کا سبب بنتا ہے۔

مختصر مدت والی دستوں کی بیماری

دستوں کی بیماری عام طور پر پاخانے کا انفیکشن (معدے اور انٹریوں کا ورم) ہوتا ہے جو کہ حسب ذیل وجوہات کے سبب ہوتا ہے:

- ایک وائرس – مثلاً نورووائرس یا روتا وائرس [یعنی وہ وائرس جو چھوٹے بچوں میں معدے اور چھوٹی آنٹ کی میوکس جہلی کی سوزش کرتے ہیں]؛
- بکٹیریا – جیسا کہ گرام منفی جراثیم، کلوسٹرائٹیم ڈیفیسائیل (سی. ڈیفیسائیل)، ایشیر کیا کولی (ای کولی)، سالمونیلا یا شیجیلا؛ یہ سب کے سب غذائی زیریت کا سبب بنتے ہیں؛

- parasites – such as the Giardia intestinalis parasite that causes giardiasis

Other possible causes of short-term diarrhoea include:

- feelings of anxiety
- drinking too much alcohol
- a food allergy
- appendicitis
- damage to the lining of the intestines as a result of radiotherapy

Medicines

Diarrhoea can also sometimes be a side effect of a medication, including:

- antibiotics
- antacid medicines that contain magnesium
- some chemotherapy medicines
- non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
- selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
- statins – cholesterol-lowering medicines
- laxatives – medicine used to help empty your bowels

The patient information leaflet that comes with your medicine should state whether diarrhoea is a possible side effect.

Long-term diarrhoea

Conditions that can cause persistent diarrhoea include:

- irritable bowel syndrome (IBS) – a poorly understood

- پیراسائیس - جیسا کہ جیار ڈیا انٹسائیل پیراسائیس ہیں جو کہ بالغ افراد کو پیچش اور دیگر علامات میں مبتلا کرتے ہیں؛

مختصرمدت کے دستوں کی بیماری کی دیگر وجہات میں یہ شامل ہیں:

- پیچیدہ جذباتی حالت کا احساس؛
- بہت زیادہ شراب نوشی کرنا؛
- غذائی الرجی؛
- زائد آنت کی سوزش؛
- ریڈیو تھراپی کی وجہ سے آنٹوں کی جہلی کو نقصان پہنچنا۔

ادویات

دستوں کی بیماری بعض اوقات دوائی کے مضرائر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بشمول:

- ایٹھی باپوٹک ؟

تیز ابیت ختم کرنے والی ادویات جن میں میگنیشیم ہوتا ہے؛

- چند ایک کیمو تھراپی کی ادویات؛

سوش رفع کرنے والی غیر اسٹیرائیڈ ادویات (این ایس اے آئی ڈیز)؛

- سلیکٹو سیرو ٹینیئن ریوبیٹیک انہیٹر (ایس ایس آر آئی ایس)؛

اسٹاٹینز - کولیسٹرون کم کرنے والی ادویات۔

دست آور ادویات - وہ ادویات جو آپکو پاخانہ لانے میں مدد دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

مریضوں کی معلومات کا دستی اشتعار جو آپ کی دوائی کے ساتھ آتا ہے اس میں درج ہونا چاہیے کہ آیا دست آنا کوں سے ممکنہ اطرافی اثرات رکھتا ہے۔

طویل مدت والی دستوں کی بیماری

وہ حالات جو مسلسل دست آوری کا سبب بن سکتے ہیں ان میں حسب ذیل شامل ہیں:

- خراش اور معانی عالمیہ (آئی بی ایس) - پاخانے کی معمول کی کارکردگی پر اثر انداز

condition that affects the normal functions of the bowel

- inflammatory bowel disease – conditions that cause the gut to become inflamed, such as Crohn's disease and ulcerative colitis
- coeliac disease – a digestive condition where you have an adverse reaction to gluten
- bile acid malabsorption – where bile produced by the liver builds up in the digestive system
- chronic pancreatitis – inflammation of the pancreas
- diverticular disease – where small bulges or pockets develop in the lining of the intestine
- bowel cancer – this can cause diarrhoea and blood in your stools

Persistent diarrhoea can also sometimes occur after surgery on the stomach, such as a gastrectomy. This is an operation to remove part of the stomach – for example, as a treatment for stomach cancer.

Diagnosing diarrhoea

Most cases of diarrhoea get better within a week and you may not need to visit your GP.

Read more about [when to visit your GP if you have diarrhoea](#).

The information below explains what will happen if you need to see your GP.

Identifying the cause

To identify what is causing your diarrhoea, your GP may ask

بونے والی بیماری جس کے بارے میں معلومات کو درست طور پر نہیں سمجھا گیا؛

پاخانے کی ورمی بیماری – وہ صورتحال جو آنت کی سوزش پیدا کرتی ہے مثلاً "کروین کا مرض اور السریٹیو کولانی ٹس"

شکم کا مرض – ہاضمے کی ایک حالت جس میں آپ گلوٹن کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں؛

جگر کا ایسٹ جذب ہونے کا نقص - جہاں جگر کا تیار کردہ سیال نظام بضم میں اکٹھا ہو جاتا ہے؛

لبابے کی دیرینہ سوزش - لبلاں کی سوزش؛

عطفہ کی بیماری – جس میں آنتوں کی جہلی کے اندر چھوٹے چھوٹے گومڑ یا تھیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں؛

پاخانے کا کینسر – یہ آپ کے پاخانے سے دست یا خون آنے کا سبب پیدا کرتا ہے۔

بس اوقات معدے کی سرجری کے بعد مسلسل دست آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ معدہ براری ہے۔ یہ ایک اپریشن ہوتا ہے جس میں معدے کا ایک حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر معدے کے کینسر کا علاج۔

دستوں کی بیماری کی تشخیص

دستوں کی بہت سی بیماریاں ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہیں اور آپکو جی پی سے ملنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اس بارے میں مزید مطالعہ فرمائیں: [اگر آپ کو دست آریے یوں تو جی بی کو ویزٹ کریں۔](#)

ذیل میں دی گئی معلومات بتاتی ہیں کہ جب آپ جی سے ملیں گے تو کیا ہو گا۔

علت کی نشاندہی کرنا

اس بات کی نشاندہی کرنا کہ آپ کو کس وجہ سے دست لگے ہوئے ہیں آپکا جی پی آپ سے سوالات پوچھ سکتا ہے مثلاً:

you questions, such as:

- what your stools are like – for example, if they are very watery or contain blood
- how often you need to go to the toilet
- whether you have other symptoms, such as a high temperature (fever)
- whether you have been in contact with anyone else who has diarrhoea, or recently travelled abroad – this may mean you have picked up an infection
- whether you have recently eaten out anywhere – this may mean you have food poisoning
- whether you're taking medication and if it has recently changed
- whether you have been stressed or anxious recently

Stool sample

Your GP may ask you for a stool sample so it can be analysed for signs of an infection if you have:

- persistent diarrhoea that has lasted more than two weeks
- blood or pus in your stools
- symptoms that affect your whole body, such as a fever or dehydration
- a weakened immune system – for example, because you have HIV
- recently travelled abroad
- recently been in hospital or been taking antibiotics

• آپ کا پاخانہ کس طرح کا ہے - مثال کے طور پر کیا وہ بہت زیادہ پتلائے یا اس میں خون موجود ہے؟

• آپ کو کتنی بار ٹوانٹ جانے کی ضرورت پیش آئی ہے،
کیا کوئی مزید علامات بھی ہیں، مثلاً "بلند درجہ حرارت (بخار)؛

• کیا آپ کسی اور شخص کے ساتھ ملے ہیں جس کو دست لگے بؤئے تھے یا آپ نے حال ہی میں بیرون ملک سفر کیا ہے - اس کا مطلب یہ ہے کہ آپکو انفیکشن بو گیا ہے؟

• خواہ آپ نے کسی بھی جگہ کوئی چیز کھائی ہو - اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غذائی زبریت بو گئی ہے؟

• خواہ آپ دوائی لے رہے ہوں یا اس کو حال ہی میں تبدیل کیا گیا ہو،
یا آپ حال ہی میں ذہنی دباؤ یا فکر مندی کا شکار رہے ہوں؟

پاخانے کا نمونہ

آپ کا جی پی آپکو پاخانے کا نمونہ دینے کا کہہ سکتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کے انفیکشن کا تجزیہ کیا جا سکے کہ آیا آپ کو:

• متواتر دست آرہے ہیں جو کہ دو ہفتوں سے زیادہ دیر سے جاری ہیں؛

• آپ کے پاخانے میں خون یا پیپ ہے؛

• وہ علامات جو کہ آپ کے پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں مثال کے طور پر بخار یا جسم سے پانی کا زیاب؛

• ایک حکم زور مدافعتی نظام - مثلاً "آپ کو ایچ آئی وی ہے؛

• حال ہی میں بیرون ملک سفر کیا ہے؟

• حال ہی میں ہسپیت میں رہے ہیں یا اینٹی بائیوٹک لیتے رہے ہیں۔

خون کے ٹیسٹس

Blood tests

Your GP may suggest you have some [blood tests](#) if they suspect your diarrhoea is being caused by an underlying health condition.

For example, your blood can be tested for signs of inflammation, which may suggest inflammatory bowel disease.

Rectal examination

Your GP may recommend a digital rectal examination (DRE) if you have unexplained persistent diarrhoea, particularly if you're over 50.

During a DRE, your GP will insert a gloved finger into your bottom to feel for any abnormalities. It can be useful for diagnosing conditions that affect your rectum and bowel.

Further investigations

If you have persistent diarrhoea and your GP is unable to find the cause, they may refer you to your local hospital for further investigation.

You may have:

- a sigmoidoscopy – an instrument called a sigmoidoscope (a thin, flexible tube with a small camera and light on one end) is inserted into your bottom and up into your bowel
- a colonoscopy – a similar procedure that uses a larger tube called a colonoscope to examine your entire bowel

اگر آپکے جی پی کو شک ہو کہ آپکے دستوں کی بیماری صحت کی کسی بنیادی صورتحال کی وجہ سے ہے تو وہ آپ کو [خون کے ٹیسٹوں](#) کا کہہ سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر آپ کا خون سوزش کی علامات کے لیے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے جو کہ پاخانے کی ورمی بیماری کا بتا سکتا ہے۔

مقد کا معائنه

اگر آپکو متواتر دست لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، خاص طور پر جب آپکی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو آپکا جی پی ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن (ڈی آر ای) تجویز کر سکتا ہے۔

ڈی آر ای کے عمل کے دوران آپ کا جی پی دستانے کے ساتھ آپ کے پیچھے انگلی داخل کر سکتا ہے تاکہ کوئی غیر معمولی صورتحال معلوم کی جاسکے۔ یہ عمل آپ کے پاخانے اور مقد پر اثر انداز ہونے والی صورتوں کی تشخیص کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔

مزید تحقیقات

اگر آپ کو مسلسل دست آ رہے ہیں اور آپکا جی پی وجہ معلوم نہیں کر سکتا تو وہ مزید تحقیق کے لیے آپ کو مقامی بسپتال کے پاس ریفر کر سکتا ہے۔

آپ یہ کرو سکتے ہیں:

- سیگموئیڈو اسکوپی [ایک لچکیلی نلی کے ذریعے معائنه] - ایک الہ جس کو سیگموئیڈو اسکوپ کہتے ہیں (جو کہ کیمرہ لگی ایک پتلی سی لچکدار ٹیوب ہوتی ہے اور اس کے سرے پر روشنی ہوتی ہے) کو آپکے نیچے سے آپکے پاخانے تک گزارا جاتا ہے۔

- کلونواسکوپی [بڑی آنت کی اندرولنی جھلی کا معائنه] - اسی طرح کا عمل ہے جس میں آپ کی مکمل آنت کا معائنه کرنے کے لیے قدرے ایک بڑی ٹیوب جس کو کلونواسکوپ کہتے ہیں استعمال کی جاتی ہے۔

Treating diarrhoea

Diarrhoea will usually clear up without treatment after a few days, particularly if it's caused by an infection.

In children, diarrhoea will usually pass within 5 to 7 days and will rarely last longer than 2 weeks.

In adults, diarrhoea usually improves within 2 to 4 days, although some infections can last a week or more.

While waiting for your diarrhoea to pass, you can ease your symptoms by following the advice outlined below.

Drink fluids

It's important to drink plenty of fluids to avoid dehydration, particularly if you're also vomiting. Take small, frequent sips of water.

Ideally, adults should drink a lot of liquids that contain water, salt, and sugar. Examples are water mixed with juice and soup broth. If you're drinking enough fluid, your urine will be light yellow or almost clear.

It's also very important for babies and small children not to become dehydrated. Give your child frequent sips of water, even if they are vomiting. A small amount is better than none. Fruit juice or fizzy drinks should be avoided as they can make diarrhoea worse in children.

If you're breastfeeding or bottle feeding your baby and they have diarrhoea, you should continue to feed them as normal.

Contact your GP immediately if you or your child develop any symptoms of dehydration.

دستوں کی بیماری کا علاج کرنا

دستوں کی بیماری خاص طور پر جب یہ انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہو عام طور پر بغیر علاج کے چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔

بچوں کے اندر دستوں کی بیماری عام طور پر 5 تا 7 دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ کبھی کبھار ہی 2 بفتوں سے زیادہ دیر تک رہتی ہے۔

عام طور پر بالغ افراد میں دستوں کی بیماری 2 تا 4 ایام میں بہتر ہو جاتی ہے تاہم چند ایک انفیکشن ایک بفتے یا اس سے زیادہ تک موجود رہتے ہیں۔

جب آپ دستوں کی بیماری کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں تو مندرجہ ذیل مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی علامات کو آسان بنانے کے لیے:

سیال نوش فرمائیں

یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جسم سے پانی کے زیادہ سے بچنے کے لیے, خاص طور پر جب آپ التیار کر رہے ہوں تو کافی مقدار میں پانی پیں۔ پانی کی بار بار چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیں۔

عام طور پر ایک بالغ شخص کو کافی مقدار میں سیال نوش کرنا چاہیے جس میں نمک اور چینی ملے ہوئے ہوں۔ اس کی مثالوں میں جوس اور یخنی ملا پانی شامل ہیں۔ اگر آپ کافی مقدار میں سیال کا استعمال کر رہے ہوں تو آپکا پیشاب بلکا پیلا یا تقریباً صاف ہو گا۔

یہ بہت لازمی ہے کہ شیر خوار اور نو عمر بچوں میں پانی کی کمی واقع نہ ہونے دی جائے۔ اپنے بچے کو خواہ وہ التیار کر رہے ہوں بار بار پانی کے گھونٹ دیں۔ تھوری سی پانی کی مقدار بالکل نہ دینے سے بہتر ہے۔

فروٹ جوس یا غیر صحیت بخش مشروبات سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے بچوں کے اندر دستوں کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔

اگر آپ اپنے بچے کو سینے یا بوتل کے ذریعے دودھ پلا رہی ہیں اور ان کو دست لگ گئے ہیں تو آپ ان کو معمول کے مطابق غذا دینے کی کوشش کریں۔

اگر آپ یا آپکے بچے میں پانی کے زیادہ سے بچنے کی علامات پیدا ہوں تو فوری طور پر جی پی سے رابطہ کریں۔

اول ری ہائیڈریشن سلوشن

Oral rehydration solutions

Your GP or pharmacist may suggest using an oral rehydration solution (ORS) to prevent dehydration if you're at risk – for example, if you're frail or elderly. ORS can also be used to treat dehydration that has already occurred.

Rehydration solutions usually come in sachets available from your local pharmacist without a prescription. They are dissolved in water and replace salt, glucose, and other important minerals that are lost if you are dehydrated.

Children

Your GP or pharmacist may recommend giving your child an ORS if they are dehydrated or at risk of becoming dehydrated.

The usual recommendation is for your child to drink an ORS each time they have an episode of diarrhoea. The amount they should drink will depend on their size and weight.

Your pharmacist can advise you about this. The manufacturer's instructions should also give information about the recommended dose.

You may be able to give your baby an ORS if they become dehydrated, but check with your GP, pharmacist, or health visitor first.

Eating

Opinion is divided over when and what you should eat if you have diarrhoea. However, most experts agree you should eat solid food as soon as you feel able to. Eat small, light meals

آپ کا جی پی یا فارماسیسٹ آپکو اول ری ہائیڈریشن سلوشن (اور آر ایس) کا استعمال تجویز کر سکتا ہے تاکہ اگر آپ خطرے سے دوچار ہوں تو جسم میں پانی کے زیاد کو روکا جاسکے۔ مثال کے طور پر جب آپ کمزور یا بڑی عمر کے ہوں۔ اگر جسم سے پانی پہلے بی ضائع ہو گیا ہو تو اور آر ایس جسم سے پانی کے زیاد کا علاج کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

ری ہائیڈریشن سلوشن عام طور پر آپ کے لوكل فارماسیسٹ سے بلا نسخہ پیکٹوں کی صورت میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کو پانی میں حل کر لیا جاتا ہے اور یہ نمک، گلوکوز اور دیگر اہم نمکیات جو آپ کے جسم سے پانی ضائع ہو جانے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں بحال کر دینا ہے۔

بچے

اگر آپ کے بچے کے جسم سے پانی ضائع ہو گیا ہو یا وہ پانی ضائع ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہوں تو آپکا جی پی یا فارماسیسٹ او آر ایس تجویز کر سکتا ہے۔

معمول کا مشورہ یہ ہے کہ آپکے بچے کو جب بھی دست آئیں وہ او آر ایس کا استعمال کرے۔ استعمال کی جانے والی مقدار ان کے وزن اور حجم پر منحصر ہو گی۔

آپکا فارماسیسٹ اس بارے میں آپکو مشورہ دے سکتا ہے۔ کارخانہ دار کی ہدایات میں بھی مجوزہ خوراک کے بارے میں معلومات موجود ہونی چاہیں۔

اگر آپ کے بچے کے جسم سے پانی ضائع ہو جائے تو آپ اس کو او آر ایس دے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے جی پی، فارماسیسٹ یا ہلپر ویزٹر سے معلومات حاصل کر لیں۔

کھانا تناول کرنا

اس بارے میں رائے منقسم ہے کہ اگر آپ کو دستوں کی بیماری لاحق ہو جائے تو آپ کیا کھائیں اور کب کھائیں۔ تابم، زیادہ تر مابرین کا اتفاق ہے کہ جونہی آپکو محسوس ہو کہ آپ کھانے کے قابل ہیں آپکو ٹھوس غذا لینی چاہیے۔ کم مقدار میں ہلکا کھانا لین اور چربی والی یا مثالہ دار خوراک سے اجتناب کریں۔

and avoid fatty or spicy foods.

Good examples are potatoes, rice, bananas, soup, and boiled vegetables. Salty foods help the most.

You don't need to eat if you've lost your appetite, but you should continue to drink fluids and eat as soon as you feel able to.

Children

If your child is dehydrated, do not give them any solid food until they have drunk enough fluids. Once they have stopped showing signs of dehydration, they can start eating their normal diet.

If your child is not dehydrated, offer them their normal diet. If they refuse to eat, continue to give them fluids and wait until their appetite returns.

Medication

Antidiarrhoeal medicines

Antidiarrhoeal medicines may help reduce your diarrhoea and slightly shorten how long it lasts. However, they're not usually necessary.

Loperamide is the main antidiarrhoeal medicine used, as it has been shown to be effective and causes few side effects.

Loperamide slows down the muscle movements in your gut so more water is absorbed from your stools. This makes your stools firmer and they're passed less frequently.

اچھی مثالوں میں، آلو، چاول، کیلا، سوپ اور الی ہوئی سبزیاں شامل ہیں۔ نمک والی خوراکیں زیادہ مفید ہوتی ہیں۔

اگر آپکے بھوک ختم ہو گئی ہو تو آپکو کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سیال نوش کرنا جاری رکھیں اور جونہی آپ کھانا کھانے کے قابل ہوں کہا لیں۔

بچے

اگر آپکے بچے کے جسم سے پانی کا زیادہ ہو جائے تو ان کو اس وقت تک کوئی ٹھوس خوراک نہ دین جب تک وہ کافی مقدار میں سیال نوش نہ کر لیں۔ جس وقت ان میں پانی کے زیاد کی علامات ظاہر ہونی بند ہو جائیں وہ معمول کی خوراک لینی شروع کر سکتے ہیں۔

اگر آپکے بچے کے جسم سے پانی ضائع نہیں ہوا تو اس کو معمول کا کھانا دیں۔ اگر وہ کھانے سے انکار کر دے تو اس کو سیال کی فراہمی اس وقت تک جاری رکھیں جب تک اس کی بھوک واپس نہیں آ جاتی۔

معالجہ

دست ختم کرنے والی ادویات

دست ختم کرنے والی ادویات آپکے دستوں کے مرض کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اور ان کا دورانیہ تھوڑا سا کم کر سکتی ہیں۔ تاہم، عام طور پر یہ ادویات ضروری نہیں ہوتیں۔

لوبرامائیڈ دست ختم کرنے کے لیے استعمال کی جانی والی ایک ایم دوا ہے کیونکہ یہ مؤثر ثابت ہوئی ہے اور اس کے چند ایک ہی مضر اثرات ہیں۔

لوبرامائیڈ آپکی آنتوں میں پٹھوں کی حرکت کم کر دیتی ہے لہذا آپ کے پاخانے سے زیادہ پانی جذب کیا جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کے پاخانے کو قدرے سخت بنایا ہے اور بار بار پاخانہ کم آتا ہے۔

An alternative to loperamide is a different type of antidiarrhoeal medicine called racecadotril, which works by reducing the amount of water produced by the small intestine. Evidence suggests this medication may be as effective as loperamide for treating diarrhoea.

Some antidiarrhoeal medicines can be bought from a pharmacy without a prescription. Check the patient information leaflet that comes with the medicine to find out whether it's suitable for you and what dose you should take. Ask your pharmacist for advice if you're unsure.

Do not take antidiarrhoeal medicines if there is blood or mucus in your stools or you have a high temperature (fever). Instead, you should contact your GP for advice.

Most antidiarrhoeal medicines should not be given to children. Racecadotril can be used in children over 3 months old if it's combined with oral rehydration and the other measures mentioned above, although not all doctors recommend it.

Painkillers

Painkillers will not treat diarrhoea, but paracetamol or ibuprofen can help relieve a fever and a headache. If necessary, you can give your child liquid paracetamol or ibuprofen.

Always read the patient information leaflet that comes with the medication to check if it's suitable for you or your child and find out the correct dose. Children under 16 years of age should not be given aspirin.

لوبرامائیڈ کا متبادل دست ختم کرنے والی ایک مختلف قسم کی دوا ہے جس کو ریسیکا ڈوٹریل کہتے ہیں اور یہ چھوٹی آنت کے تیار کردہ پانی کی مقدار کو کم کر کے کام کرتی ہے۔ شوابد سے پتا چلتا ہے کہ یہ دو دستوں کے علاج کے لیے اتنی بی موثر ہو سکتی ہے جتنی کہ لوبرامائیڈ ہے۔

دست ختم کرنے والی چند ایک ادویات فارمیسی سے بلا نسخہ خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا ہے آپ کے لیے موزوں ہے اور خوراک کی کمتوں مقدار لینی چاہیے دو اکے ساتھ مریض کی معلومات کے لیے جو دستی اشتہار آتا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو اپنے فارماسیسٹ سے مشورہ لیں۔

اگر آپکے پاخانے میں بلغم یا خون موجود ہو یا آپکا درجہ حرارت (بخار) زیادہ ہو تو دست روکنے والی ادویات استعمال نہ کریں۔ اس کے بجائے آپکو اپنے جی پی کے ساتھ مشورے کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔

دست روکنے والی زیادہ تر ادویات بچوں کو نہیں دی جانی چاہیں۔ اگر ریسیکا ڈوٹریل کو اول ری ہائیڈریشن کے ساتھ ملایا جائے اور مندرجہ بلا دیگر اقدامات بروئے کار لائے جائیں تو یہ تین ماہ سے زیادہ عمر کے بچوں کو دی جا سکتی ہے تاہم تمام ڈاکٹر یہ تجویز نہیں کرتے۔

درد میں افاقہ کرنے والی ادویات

درد کم کرنے والی ادویات دستوں کو ختم نہیں کریں گی لیکن پیراسیٹامول یا آئی بروفین بخار اور سردرد میں افاقہ کر سکتی ہیں۔ اگر ضروری ہو تو آپ اپنے بچے کو محلول پیراسیٹامول اور آئی بروفین دے سکتے ہیں۔

دوا کے ساتھ آنے والے دستی اشتہار ہمیشہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ آپ یا آپ کے بچے کے لیے موزوں ہے اور خوراک کی درست مقدار کیا ہے۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کو اسپرین نہیں دی جانی چاہیے۔

اینٹی بائیوٹک

اگر وجہ معلوم نہ ہو تو دستون کی بیماری میں اینٹی بائیوٹک کے ذریعے علاج تجویز نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک:

- اگر دست وائرس کی وجہ سے لگے ہیں تو کام نہیں کرے گی؛
- غیر خوشگوار مضر اثرات مرتب کر سکتی ہے؛
- اگر اس کو معمولی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بار بار استعمال کیا جائے تو زیادہ تشویشناک صورتحال کا علاج کرنے کے لیے کم مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔

اگر آپکو شدید قسم کے دست آرہے ہیں اور اس کی وجہ ایک مخصوص قسم کا بکٹیریا ہے تو اینٹی بائیوٹک تجویز کی جا سکتی ہے۔

اس کو اس وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپکو صحت کے بنیادی مسائل لاحق ہوں، مثال کے طور پر کمزور مدافعتی نظام۔

ہسپتال کا علاج

کبھی کبھار جب آپ یا آپ کے بچے کے جسم سے تشویشناک حد تک پانی کا زیاب ہو جائے تو ہسپتال کے علاج کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اس علاج کے ذریعے آپ کی رنگوں میں (وریدی طور پر) براہ راست سیال اور غذائی ڈالی جاتی ہے۔

بنیادی وجوہات کا علاج کرنا

اگر کوئی مخصوص وجہ تشخیص کی گئی ہے جو کہ آپ کے دستون کا سبب بن رہی ہے تو اس کا علاج کرنے سے آپ کی علامات بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

مثال کے طور پر:

- خراش اور معائی علامیہ (آئی بی ایس) کا علاج آپکی ادویات اور خوراک میں تبدیلیوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مزید مطالعہ فرمائیں: آئی بی ایس کا علاج کرنا

Antibiotics

Treatment with antibiotics is not recommended for diarrhoea if the cause is unknown. This is because antibiotics:

- will not work if the diarrhoea is caused by a virus
- can cause unpleasant side effects
- can become less effective at treating more serious conditions if they're repeatedly used to treat mild conditions

Antibiotics may be recommended if you have severe diarrhoea and a specific type of bacteria has been identified as the cause.

They may also be used if you have an underlying health problem, such as a weakened immune system.

Hospital treatment

Occasionally, hospital treatment may be needed if you or your child are seriously dehydrated. Treatment will involve administering fluids and nutrients directly into a vein (intravenously).

Treating the underlying cause

If you've been diagnosed with a specific condition that's causing your diarrhoea, treating this may help improve your symptoms.

For example:

- irritable bowel syndrome (IBS) can be treated with

- changes to your diet and medications – read more about [treating IBS](#)
- inflammatory bowel disease can be treated with medications that help reduce inflammation in the bowel
 - [coeliac disease](#) can be treated by excluding foods containing gluten from your diet – read more about [treating coeliac disease](#)
 - bile acid malabsorption can be treated with medication that helps stop bile building up in the digestive system

Preventing diarrhoea

To prevent the spread of infections that cause diarrhoea, you should always maintain high standards of hygiene.

You should:

- wash your hands thoroughly with soap and warm water after going to the toilet and before eating or preparing food
- clean the toilet, including the handle and the seat, with disinfectant after each bout of diarrhoea
- avoid sharing towels, flannels, cutlery or utensils with others
- wash soiled clothing and bed linen separately from other clothes and at the highest temperature possible – for example, 60C or higher for linen – after first removing any poo into the toilet
- avoid returning to work or school until at least 48 hours after the last episode of diarrhoea

You or your child should also avoid swimming pools for 2 weeks after the last episode of diarrhoea.

- پاخانے کی ورمی بیماری کا علاج ادویات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جس سے دستوں کی سوزش کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- شکم کا مرض** آپکی خوراک سے گلوٹین والی غذا نکال دینے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اس بارے میں مزید مطالعہ فرمائیں: [شکم کے مرض کا علاج کرنا](#)۔
- جگر کا ایسڈ جذب ہونے کے نقص کا بذریعہ دوا علاج کیا جا سکتا ہے جو کہ سیال مادے کو نظام ہضم کے اندر اکٹھا ہونے سے روک سکتی ہے۔

دستوں کی بیماری کی روک تھام

دستوں کی بیماری کا سبب بننے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے آپکو ہمیشہ اعلیٰ درجہ حفظان صحت کے اصول اپنانے چاہیں۔

آپکو چاہیے کہ:

- ٹوانٹل جانے کے بعد، کھانا کھانے سے قبل یا کھانے کی تیاری کے وقت اپنے ہاتھوں کو صابن اور گرم پانی کے ساتھ مکمل طور پر صاف کریں؛
- دست آنے کے بعد بربار ٹوانٹل بشمول بینٹل اور سبٹ کو جراحتی کش دوا کے ساتھ صاف کریں؛
- دیگر افراد کے ساتھ تولیہ، فلاں، کٹلری یا برتن شیئر کرنے سے اجتناب کریں؛
- ممکنہ طور پر بلند درجہ حرارت پر موٹے کپڑوں اور بستر پوشوں کو دیگر کپڑوں سے الگ کر کرے دھوئیں۔ مثال کے طور پر فلاں کے لیے 60 سی یا زیادہ - سب سے پہلے پاخانے کو ٹوانٹل میں الگ کر لیں؛
- آخری بار دست آنے کے بعد کم از کم 48 گھنٹوں تک کام پر یا اسکول جانے سے اجتناب کریں۔

آخری بار دست آنے کے بعد آپ یا آپکا بچہ 2 ہفتوں کے لیے سوینمنگ پولز جانے سے اجتناب کرے۔

Food hygiene

Practising good food hygiene will help avoid getting diarrhoea as a result of **food poisoning**. You can do this by:

- regularly washing your hands, surfaces and utensils with hot, soapy water
- never storing raw and cooked foods together
- making sure food is kept properly refrigerated
- always cooking your food thoroughly
- never eating food past its use-by date

Rotavirus vaccination

Rotavirus is a virus that commonly causes diarrhoea in children. A vaccine that helps protect children against rotavirus is now part of the routine childhood vaccination schedule.

This vaccine is given as a liquid that's dropped into a baby's mouth. It's given in 2 doses, with the first given at 2 months and another at 3 months.

Travellers' diarrhoea

There is no vaccination that can protect you from all possible causes of travellers' diarrhoea. The best way to avoid it is to practise good food and water hygiene while abroad.

If you're travelling in a country where standards of public hygiene are low, you should avoid:

- tap water – water should be boiled for at least one minute

خوراک کے اصول صحت

خوراک کے اچھے اصولوں پر عمل کرنا **غذائی زہربت کے نتیجے** میں دستوں کی بیماری سے بچنے میں مدد دے گا۔ آپ یہ کام اس طرح انجام دے سکتے ہیں:

- باقاعدگی سے گرم اور صابن والے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں، سطحوں اور برتنوں کو صاف کرنا؛
- کچی اور پکی ہوئی خوراک کو کبھی بھی ایک جگہ ذخیرہ نہ کرنا؛
- اس بات کو یقینی بنانا کہ خوراک درست طور پر ٹھنڈا کیا گیا ہو؛
- اپنے کھانے کو ہمیشہ پوری طرح سے پکانا؛
- خوراک کو کبھی بھی اختتامی تاریخ کے بعد استعمال نہ کرنا۔

روٹا وائرس ویکسی نیشن [یعنی وہ وائرس جو چھوٹے بچوں میں معدے اور چھوٹی آنت کی میوکس جہلی کی سوزش پیدا کرتے ہیں]

روٹا وائرس وہ وائرس ہے جو عام طور پر بچوں میں دستی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ویکسین جو بچوں کو روٹا وائرس سے تحفظ فراہم کرتی ہے حالیہ دنوں میں اس کو بچپن میں دی جانے والی ویکسین نیشن کے پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے۔

یہ ویکسین سیال مادے کی صورت میں دی جاتی ہے جس کو بچے کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دو خوراکوں میں دی جاتی ہے، پہلی 2 مہینوں کے بعد دی جاتی ہے جبکہ دوسرا 3 مہینوں کے بعد۔

دوران سفر دست آنا

ایسی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے جو کہ آپکو سفر کے دوران دستوں کی ممکنہ وجوہات سے تحفظ فراہم کر سکے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ بیرون ملک موجودگی کے دوران اچھی خوراک اور پانی کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔

اگر آپ کسی ایسے ملک میں سفر کر رہے ہیں جہاں پر عوامی صحت کے اصولوں کا معیار کم درجہ ہے تو آپکو ان سے اجتناب کرنا چاہیے:

- نلکے کا پانی - پانی کو کم از کم ایک منٹ تک ابال لینا چاہیے اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آیا

اس کا پینا محفوظ ہے؛

آنیس کیوبز اور آنیس کریم؛

کچی اور کم پکی بوئی سمندری غذا، گوشت اور چکن؛

وہ خوراک جس میں ان پکے انڈے موجود ہوں، مثلاً میونیز؛

بکٹیریا سے پاک نہ کی گئی ڈیری کی اشیاء مثلاً پنیر؛

پہل اور سبزیاں جن کی جلد کو نقصان پہنچا ہو؛

سلامدین؛

مندرجہ ذیل چیزوں کھانا پینا عام طور پر محفوظ ہوتا ہے:

وہ خوراک جس کو پوری طرح سے پکایا گیا ہو اور گرم گرم پیش کیا گیا ہو؛

پانی، غیر صحت بخش مشروبات اور الکھل کی سیل شدہ بوتیں یا ڈبے؛

وہ پہل اور سبزیاں جن کو آپ خود چھیلیں؛

چائے یا کافی۔

اگر آپ بیرون ملک سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں تو آپ جن ممالک کا سفر کرنا چاہتے ہوں

وہاں کی ہیلٹھ ایڈوائس حاصل کریں۔ یہ کام آپ اسکو ویزٹ کر کے کر سکتے ہیں [این ایج ایس فٹ](#)

[فار ٹریول اور نیشنل ٹریول ہیلتھ نیٹورک اینڈ سینٹر \(این اے ٹی ایج این اے سی\)](#) ویب سائیٹس۔

if you're not sure whether it's safe to drink

- ice cubes and ice cream
- raw or undercooked seafood, meat, and chicken
- foods that might contain uncooked eggs, such as mayonnaise
- unpasteurised milk and dairy products, such as cheese
- fruit and vegetables with damaged skins
- salads

It's generally safe to eat or drink:

- food that has been thoroughly cooked and is served piping hot
- sealed bottles or cans of water, fizzy drinks, and alcohol
- fruit and vegetables you peel yourself
- tea or coffee

If you're planning a trip abroad, check health advice for the countries you will be travelling to. You can do this by visiting [NHS Fit for Travel](#) and [National Travel Health Network and Centre \(NaTHNaC\)](#) websites.